



Vigyázat! Támad a selyemfényű puszpángmoly!

2011-ben egy új, távol-keleti eredetű dísznövénykártevő lepkefaj jelent meg hazánkban, amely az elmúlt évben, több térségben jelentős károkat okozott puszpángbokrokra és -sövényeken, parkokban, temetőken, közterületeken és házi kertekben egyaránt.

Életmód

Ázsiai elterjedésű faj. Eredeti élőhelyén akár évente öt generációja is kifejlődhet. Európában az eddigi megfigyelések alapján csak három generációval szaporodik.

A nőstény csomókban rakja le tojásait a levelek fonákára. A hernyók kezdetben csak hámozgatják a leveleket, később teljes egészében elfogyasztják azokat. A levelekből készített laza szövédékben bábozódnak. Az utolsó nemzedék a szövédékben telel át.

Tápnövény

Legfőbb tápnövénye a puszpáng (*Buxus sempervirens*), de más Buxus nemzetségbe tartozó fajokon is kifejlődhet, de hazánkban ez nem jellemző.

Védekezés

Tavasszal a hernyók megjelenése után azonnal vegyszeres kezelés szükséges!

A kártevő kiirtását követően a károsult részeket alaposan messük vissza. Mivel a buxusfélék könnyen, gyorsan regenerálódnak, a metszést követően hamarosan újjahajt.

A nyesedékkal a továbbiakban úgy bánhatunk, mint bármely más zöldhulladékkal.

Házi kertben használható rovarölőszerek:

- Dimilin 25 WP
- Dipel
- Actara 25WP
- Mospilan 20 Sp

A rovarölőkhöz nedvesítőszer hozzákeverése javasolt.

A kezelést 10-14 nap múlva meg kell ismételni!

A permetezést csak a környezetvédelmi és munkavédelmi előírások betartása mellett végezzük! Alaposan olvassuk el a terméken lévő tájékoztatót! Tömény szer vagy bekevert oldat csatornába, természetes vízfolyásba, árokba nem önthető!

Annyi szert keverjünk be, amennyit elhasználunk. A permetezést megfelelő védőruházatban végezzük. A gyermekek játékeit a kezelés környezetéből távolítsuk el. Permetezéskor kerüljük a szeles időt, valamint a csapadékos időjárást. A fel nem használt szereket gyermekektől, illetéktelenektől gondosan zárjuk el.

Törökbálint, 2015. április 3.

Antal Jenő
intézményvezető





A faj neve: **selyemfényű puszpángmoly**
(*Cydalima perspectalis*)



A kártevő fejlett hernyói:



A kezdeti kárkép: hámozgatás a növényen



Végkifejlet: tarrágás a buxuson

